

Trousse d'urgence:
Liste de contrôle par principe actif

PRINCIPE ACTIF	INDICATION	EMBALLAGE	MINIMUM
acide acétylsalicylique	infarctus aigu du myocarde	comprimés à 80 mg	10 comprimés
	angor instable		
adrénaline	choc anaphylactique	ampoules à 1 mg/ml	2 ampoules
	laryngite striduleuse		
bromure d'ipratropium	crise aiguë d'asthme, exacerbations aiguës de BPCO	aérosol doseur 20 µg/dose	1 aérosol doseur
diazépam	convulsions et état de mal épileptique	ampoules à 10 mg/2 ml	2 ampoules
diclofénac	colique biliaire	ampoules à 75 mg/3ml	3 ampoules
	colique néphrétique		
dimenhydrinate	vertige aigu	suppositoires à 120 mg	3 suppos
dinitrate d'isosorbide	crise hypertensive	comprimés à 5 mg pour administration SL	5 comprimés
	œdème pulmonaire		
	infarctus aigu du myocarde,		
	angor instable		
furosémide	œdème pulmonaire	ampoules à 20 mg/2ml	4 ampoules
glucagon	coma hypoglycémique	ampoule à 1 mg /1 ml	1 ampoule
glucose hypertonique	coma hypoglycémique		2 ampoules
halopéridol	agitation dans le cadre d'une psychose	comprimés à 5 mg	3 comprimés
		ampoules à 5 mg/1 ml	2 ampoules
ibuprofène	migraine	comprimés à 600 mg	4 comprimés
lorazépam	agitation	comprimés à 1 mg	6 comprimés
		ampoules à 4mg/1 ml	2 ampoules
métoclopramide	migraine	comprimés à 10 mg	6 comprimés
	vertige aigu	ampoules à 10 mg/2 ml	2 ampoules

Trousse d'urgence:
Liste de contrôle par principe actif

PRINCIPE ACTIF	INDICATION	EMBALLAGE	MINIMUM	
méthylprednisolone	choc anaphylactique	ampoules à 125 mg/2 ml	2 ampoules	
	crise aiguë d'asthme, exacerbations aiguës de BPCO, laryngite striduleuse	ampoules à 40 mg/1 ml	4 ampoules	
	crise aiguë d'asthme exacerbations aiguës de BPCO,	comprimés à 32 mg	5 comprimés	
	miniplasco 10 ml NaCl solution 0,9%	diluer de la morphine ou de la naloxone		2 ampoules
	morphine	douleur abdominale aiguë colique biliaire infarctus aigu du myocarde colique néphrétique	ampoules à 10 mg/1 ml	2 ampoules
naloxone		surdosage d'opioïdes	ampoules à 0,4 mg/1 ml	1 ampoule
paracétamol		migraine	comprimés à 1 g	10 comprimés
phytoménadione		saignement du aux anticoagulants oraux	ampoules à 2 mg/0,2 ml	5 ampoules
prométhazine	dystonie aiguë suite au traitement d'agitation dans le cadre d'une psychose	ampoules à 50 mg/2 ml	2 ampoules	
	vertige aigu			
salbutamol	anaphylaxie	aérosol doseur 100 µg/dose	1 aérosol doseur	
	crise aiguë d'asthme			
	exacerbations aiguës de BPCO			
canule rectale			1	
inhalateur			1	
matériel pour administration IV			2	
matériel pour administration IM			2	
seringue de 10 ml			2	